

Síndrome Mielodisplásica

Azacitidina

Azacitidina: 75 mg/m^2 SC diariamente por 7 dias a cada 6 semanas. Pacientes devem ser tratados por pelo menos 4 ciclos.

Ref. (1)

Decitabina

Decitabina: 15 mg/m^2 IV infusão contínua de 3 horas a cada 8 horas por 3 dias a cada 4 semanas. Pacientes devem ser tratados por pelo menos 4 ciclos.

Ref. (2)

Decitabina: 20 mg/m^2 IV infusão contínua por 1h por 5 dias a cada 4 a 6 semanas. Pacientes devem ser tratados por pelo menos 4 ciclos.

Ref. (3)

Lenalidomida

Lenalidomida: 10 mg VO dia

A dose é continuada ou modificada baseada em achados clínicos e laboratoriais.

Ref. (4)

1. Silverman LR, et al. Further analysis of trials with azacitidine in patients with myelodysplastic syndrome. studies 8421, 8921, and 9221 by the Cancer and Leukemia Group B. *J Clin Oncol* 2006;324: 3895-3903.
2. Kantarjian H, et al. Decitabine improves patient outcomes in myelodysplastic syndromes. *Cancer* 2006; 106:1794-1780.

- 3.** Kantarjian H, *et al.* Decitabine dosing schedules. *sem in Hematolqly* 2005;32 (suppl):s17-522.
- 4.** Galili N., *et al.* Immunomodulatory drugs in myelodysplastic syndromes *Expert Opin Investig Drugs* 2006;15:805-813.